

horné krátko stopkaté, okrúhlasté, plytko dlaňovito päflaločnaté až sedemlaločnaté, na okraji hrubo zúbkaté, s vajcovitými prílistkami. Kvety sediace v pazušných hustých zväzoch. Listene kališteka čiarkovité, asi 5 mm dlhé, chlpaté, kališné lístky do polovice zrastené, len o málo dlhšie ako kališteka. Lupienky obrátene vajcovité, na báze klinovite zúžené, asi 7 mm dlhé, vpredu úzko vykrojené, bledoružové. Plod z 10–12 plôdikov. Plôdiky často na chrbtovej strane kýlnaté.

Chromozómy: $2n = 84$.

Biológia, ekológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie júl–september. Pestujú ho v záhradách, najmä s kučeravými listami – var. *crispa* L. (tab. 44, fig. 6) a niekedy zdivočuje, napr. Pannonicum. 6. Štúrovo (V. Nábělek 1936 BRA), Carpathicum. 9. Zemianske Podhradie (Holuby 1886 BRA). 13. Trenčín (Brancsik 1903 BRA; Schidlaj 1928 SLO). 14c. Krnišov (Kmeť 1876 BRA). 26b. Výborná (Fábry 1866 BRA).

Križence.

Malva neglecta × *pusilla* = *Malva* × *adulterina* Wallr. Erst. Beitr. Fl. hercyn., p. 241, 1840.

Pannonicum. 6. Bratislava, okolie (Eschfäller sec. Wiesbaur 1881b: 374, 375). – Modra, Kamenec (Zigmundík 1913 BRA).

LITERATÚRA

- Holub, J., Měsíček, J., Javůrková, V.: Annotated Chromosome Counts of Czechoslovak Plants (16–30). Fol. geobot. phytotax. 6: 196–197, 1971.
 Novák, F. A.: Názvoslovné poznámky. Čs. bot. Listy 4 (1951–1952): 109–111, 1952.
 Slavík, B.: Poznámky k určování, sběru a rozšíření slézů (rod Malva) na území ČSSR. Zpr. Čs. bot. Společ. 43–50, 1967.

Lavatera L.

Lavaterka

Lavatera thuringiaca L.

Lavaterka durínska

Ic.: Tab. 45, fig. 1, p. 388

Lavatera thuringiaca L. Sp. pl. ed. 1, p. 691, 1753.

Trváca, 50–100 cm vysoká bylina. Stonka priama, oblá, rozkonárená, oddialene olistená, na báze roztrúsene a pritlačene hviezdovito chlpatá, v hornej časti pri